

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

AILANTEX

Selektívny herbicíd pre bodovú aplikáciu vo forme suspenzného koncentráту pre likvidáciu pajaseňu žľaznatého

Účinná látka: *Verticillium nonalfalfae* 1 x 10⁶ KTJ/ml

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

Označenie prípravku: Nepridelené

- EUH401** Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.
- EUH208** Obsahuje *Verticillium nonalfalfae*. Môže vyvolať alergickú reakciu.
- P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102** Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P264** Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom.
- P270**
- P280** Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P273** Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P391** Zoberte uniknutý produkt.
- P501** Zneškodnite obsah / nádobu bezpečným spôsobom alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov
- SP1** Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).
- Z4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pri domácej, hospodárskej a voľne žijúcej zvieratá relatívne prijateľné.
- Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.
- Vo4** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné organizmy prijateľné
- V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.
- Vč3** Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie. Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových)!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Pred použitím si prečítajte sprievodné pokyny!

Výrobca: Biohelp GmbH, Kapleigasse 16, A-1110 Viedeň, Rakúsko

Osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, Česká republika, tel.: +420 545 218 156

Číslo povolenia MPRV SR: 9188/2025 (3923/2025-510)

Doba použiteľnosti: 2 mesiace

Balenie: HDPE fľaša 18 a 100 mL

Dátum výroby, číslo šarže: uvedené na obale

PÔSOBNIE PRÍPRAVKU

Suspenzia konidií huby sa aplikuje injektážou neriedeného prípravku AILANTEX do xylému pajaseňa žliazkatého. Konídie sú následne distribuované cievny systémom stromu, a vytvárajú sa lokálne ložiská mycélia, ktoré uvoľňujú enzýmy a toxíny. V dôsledku toho dôjde k vädnutiu a odumieraniu stromu. Pri včasnej aplikácii sa môžu prvé príznaky objaviť za 4–6 týždňov, pri veľkých stromoch sa efekt prejaví väčšinou až v nasledujúcom roku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Použitie	Škodlivý organizmus	Dávka/ha	Počet aplikácií/(interval medzi aplikáciami)	Ochranná doba	Poznámka
nepoľnohospodárske plochy, cesty, lesy, parky, železnice, sady, vinice, okrasné rastliny	pajaseň žľaznatý	1 – 3 ml/kmeň	1	AT	Aplikácia injektážou kmeňa

AT – ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikácia sa vykonáva injektážou, kedy sa do 1x až 3x naseknutého kmeňa stromu aplikuje 1 ml suspenzie prípravku v závislosti od veľkosti stromu. Prípravok nemožno miešať s inými prípravkami na ochranu rastlín ani s pomocnými prípravkami. Prípravok je možné aplikovať aplikačným zariadením na injektáž prípravku do dreva (ideálne tlakovým zariadením). Pri práci nepoužívať injekčné striekačky určené pre zdravotníctvo.

IFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI:

Pri dodržaní pokynov uvedených na etikete nedochádza k prejavom fytotoxicity a nebola zistená odrodová citlivosť.

OPATERNIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pri dodržaní pokynov pre aplikáciu sa vznik rezistencie nepredpokladá. Dodržujte správny termín aplikácie a povolenú dávku prípravku.

VPLYV NA ÚRODU, NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSDIACE PLODINY

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu. Výsev/výsadba následných a náhradných plodín je bez obmedzenia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KAPALINY

Aplikácia bez riedenia.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie po ukončení práce vypláchnite čistou vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Vyvarujte sa akémukoľvek kontaktu s prípravkom ak to nie je nevyhnutné. Používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP).

Aplikácia:

Pri aplikácií prípravku je potrebné používať ochranný pracovný odev, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, a gumovú pracovnú obuv. Pri manipulácii s prípravkom sa treba vyhnúť postriekaniu kože a vniknutiu prípravku do očí. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom, je zakázané jesť, piť a fajčiť. Ak nebol použitý jednorazový ochranný pracovný odev, je potrebné pracovný odev a ďalšie OOPP po ukončení práce vyprať resp. očistiť. Poškodené OOPP je potrebné urýchlene vymeniť. Aplikácia sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku v smere vetra, aby nebola zasiahnutá obsluha a ďalšie osoby.

Pri aplikácii sa neodporúča používať kontaktné šošovky. Práca s prípravkom je zakázaná tehotným a ženám, mladistvým a je nevhodná pre osoby trpiace alergickým ochorením.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: v prípade zdravotných problémov alebo v prípade pochybností zavolajte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety.

Pri nadýchaní: prerušte expozíciu, prejdite na čerstvý vzduch, prípadne kontaktujte lekára.

Pri styku s kožou: odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesta umyte pokiaľ možno vlažnou vodou a pokožku dobre opláchnite.

Pri zasiahnutí očí: odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, súčasne vyplachujte oči veľkým množstvom tečúcej čistej vody po dobu 15 min. Kontaktné šošovky nemožno opätovne použiť, je potrebné ich zlikvidovať.

Pri požití: vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť pohár (1/4 l) vody. Nevývolávajte zvracanie. Ak nie je postihnutý pri vedomí, uveďte ho do stabilizovanej polohy.

V prípade potreby možno konzultovať s **Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel.: 02/54 774 166.**

SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom mieste do 8 °C. Odporúčame prípravok skladovať iba v originálnom balení, v suchých vetraných priestoroch. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Uchovávajte ich oddelene od potravín, krmív a liekov. Neskladujte spolu so horľavými a infekčnými látkami. Skladujte mimo dosahu detí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky zneškodnite ako nebezpečný odpad.