

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych aj neprofesionálnych používateľov

TRICHOPLUS® B

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ

Pomocný prípravok so živými makroorganizmami *Trichogramma cacoeciae* na ochranu zeleniny pred napadnutím húsenicami psoty rajčiakovej (*Tuta absoluta*), formulovaný pre aplikáciu ako voľný materiál.

AKTÍVNA ZLOŽKA

Trichogramma cacoeciae **97 % hm.**

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE

- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platným zákonom o odpadoch.
- EUH401** **Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.**

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Držiteľ autorizácie: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.
Mayerova 784, 664 42 Modřice
Česká republika
tel./fax: 545 218 156
www.biocont-profi.cz

Distribútor: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o.
Mayerova 784, 664, 42 Modřice
Česká republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **22-01270-PM**

Dátum výroby: uvedený na obale
Číslo výrobnej šarže: uvedený na obale
Balenie: 1 l PAP tuba
(100 000 ks, 200000 ks alebo 400000 ks)

PÔSOBENIE POMOCNÉHO PRÍPRAVKU

Parazitická osička rodu *Trichogramma* je vaječný parazit, ktorý kladie svoje vajíčka do vajíčok hostiteľských druhov motýľov, kde prebieha celý jej vývoj. Tak dochádza k redukcii liahnutia húseníc a obmedzeniu napadnutia plodiny. *Trichogramma* sa v poraste ďalej množí a jej pôsobenie trvá po celú dobu náletu a kladenia vajíčok škodcu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka/100 m ²	Ochranná doba	Poznámka
zelenina	psota rajčiaková	4 000 ks alebo 8 000 ks	AT	

AT - ochranná lehota je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikácia sa vykonáva ručne. Voľný materiál rozsypte na rastliny na najvyššie vyvinuté listy. **Termín aplikácie:** prvá aplikácia na začiatku výskytu psoty pri monitorigu, druhá a ďalšie aplikácie v prípade rozvláčneho náletu po 10 dňoch.

Dávka: nižšia aplikačná dávka (4000 ks) je odporúčaná do mladých výsadiieb, pri nižšej miere napadnutia; vyššia aplikačná dávka (8000 ks) je odporúčaná do starších výsadiieb, pri vyššej miere napadnutia.

TRICHOPLUS B je kompatibilný s ostatnými bioagens použiteľnými v systémoch integrovanej produkcie a biologickej ochrany. V prípade nutnosti aplikujte až 10 dní po postreku insekticídom.

Znížená účinnosť parazitov je pri vysokých populačných hustotách škodcu alebo pri neskorej aplikácii.

Miešateľnosť prípravkov:

Použitie prípravku v zmesiach s inými prípravkami alebo látkami nepripadá do úvahy.

Po dobu pôsobenia neaplikujte pesticídy toxické voči parazitickým osičkám rodu *Trichogramma*. Rizikové pre parazitické osičky sú najmä syntetické pyrethroidy, prípravky na báze síry.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Aplikácia pomocného prípravku nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny:

V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.), alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára.

Pri nadýchaní:

Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste postihnutého mimo ošetrovanú oblasť.

- Pri zasiahnutí pokožky:** Odložte kontaminovaný/nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte.
- Pri zasiahnutí očí:** Vypláchnite oči podobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich.
- Pri náhodnom požití:** Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie.

Pri vyhľadání lekárskeho ošetrovania informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, poskytnite mu informácie z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421/2/54 774 166.

SKLADOVANIE

TRICHOPLUS B aplikujte bezprostredne po otvorení obalu. Ak nie je možné prípravok aplikovať v deň dodania produktu, je možné krátkodobé skladovanie najviac 24 hodín od dodania v originálnych uzavretých obaloch na suchom, chladnom mieste pri teplote cca 6-8 °C a relatívnej vzdušnej vlhkosti 70 % oddelene od chemických prípravkov a prchavých látok. Prípravok nesmie zmrznúť. Prípravok sa musí použiť pred dátumom expirácie uvedenom na obale.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Použiteľné prebytky sa aplikujú na plodinu. S obalmi sa zaobchádza ako s komunálnym odpadom.